

Checklista 2: Metylfenidat (MPH) – checklista för fortgående övervakning

Följande är utformat som ett stöd för övervakning av pågående behandling med produkter som innehåller MPH för lämpliga patienter med ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder).

Enligt mer detaljerad beskrivning i förskrivningsinformationen ska tillväxt, psykiatrisk och kardiovaskulärt status kontrolleras regelbundet:

- Blodtryck och puls ska journalföras vid varje justering av dosen och därefter minst var 6:e månad
- Längd, vikt och aptit ska journalföras minst var 6:e månad med hjälp av ett tillväxtdiagram
- Utveckling av nya eller förvärring av existerande psykiska störningar ska monitoreras vid varje dosjustering och därefter minst var 6:e månad samt vid varje besök

Användning av denna checklista rekommenderas tillsammans med fullständig förskrivningsinformation för enskild, förskrivna produkt.

Ladda ned och skriv ut denna checklista före konsultation. Det går inte att lagra patientspecifik information på webbplatsen. Den ifyllda checklistan kan dokumenteras som en del av patientjournalen.

När du går igenom checklistan kan det också vara värdefullt att diskutera bipacksedeln för enskild förskrivna produkt, tillsammans med patienten och dennes föräldrar eller vårdnadshavare.

Övervakning under pågående behandling med metylfenidat (MPH)

Datum för bedömning:	
Skäl för bedömningen:	
Patientens namn:	
Födelsedatum:	
Ålder:	Kön:

Granska noggrant följande system som anges nedan vid varje dosjustering och vid uppföljande besök minst var 6:e månad:

	Utvärderat
Allmänna medicinska uppgifter	
• Journalför längd, vikt och aptit (se separat diagram för uppföljning)	<input type="checkbox"/>
Överväg att sätta ut MPH om tillväxten är mindre än förväntat	
• Journalför alla tecken på missbruk, felaktig användning eller nöjesbruk av MPH	<input type="checkbox"/>
• Graviditet	<input type="checkbox"/>
Utvärdera nytta/risker	
Nya kardiovaskulära uppgifter	
	Blodtryck och puls ska journalföras
• Hjärtklappning	<input type="checkbox"/>
• Ansträngningsutlöst bröstsmärta	<input type="checkbox"/>
• Oförklarad synkope	<input type="checkbox"/>
• Dyspné	<input type="checkbox"/>
• Andra symtom som tyder på kardiologisk sjukdom	<input type="checkbox"/>
Remittera direkt till specialist i kardiologi för utvärdering/bedömning	
Nya neurologiska uppgifter	
• Svår huvudvärk, känselbortfall, svaghet eller paralys, försämring av koordination, syn, tal, språk eller minne	<input type="checkbox"/>
Något av ovan nämnda tillstånd kan tyda på cerebral vaskulit: sätt ut MPH	
• Ökning av anfallsfrekvensen eller om anfall uppträder för första gången	<input type="checkbox"/>
MPH ska sättas ut	

		Utvärderat
Nya psykiatriska symtom eller förvärring av dessa	Utveckling av nya eller förvärring av existerande psykiska störningar ska monitoreras	
• Psykotiska eller maniska symtom		<input type="checkbox"/>
Överväg att sätta ut MPH		
• Självmordstankar eller självmordsbeteenden		<input type="checkbox"/>
Överväg behandling av underliggande psykiatriskt tillstånd		
Omvärdera nytta/risker		
Överväg att sätta ut MPH		
• Aggressivt eller fientligt beteende		<input type="checkbox"/>
Överväg behovet av justering av behandling		
• Ångest, agitation eller spänningar		<input type="checkbox"/>
• Depressiva symtom		<input type="checkbox"/>
• Motoriska eller verbala tics eller förvärrande av sådana		<input type="checkbox"/>
Behandlingens varaktighet		
• Patienten behandlas kontinuerligt i > 12 månader		<input type="checkbox"/>
• Förbättring av symtom observeras efter lämplig dosjustering under en månad, annars rekommenderas utsättande av medicineringsen		<input type="checkbox"/>
Överväg provperiod utan medicinering minst en gång per år för att fastställa om fortsatt behandling fortfarande är nödvändig		

Dokumentera ytterligare information här

Efter utvärdering av ovanstående, fyll i tillhandahållen tabell för att dokumentera de uppgifter som krävs för fortgående övervakning: ([länk till tabell](#))

Slutet av behandling

Noggrann uppsikt är nödvändig under tiden efter utsättande av läkemedlet, eftersom följande kan uppkomma

- **Depression** såväl som
- **Kronisk överaktivitet**

Vissa patienter kan kräva uppföljning under lång tid.