

Medikinet®
Metylfenidat



5 mg



10 mg



20 mg




30 mg



40 mg



50 mg



60 mg



5 mg

Skårad ochpräglad
med bokstaven S



10 mg

Skårad ochpräglad
med bokstaven M




20 mg

Skårad ochpräglad
med bokstaven L

Dessa kapslar och tabletter innehåller ingen aktiv substans

En bra start på dagen



Referenser:

T. Banaschewski et al. Long-acting medications for the hyperkinetic disorder. A systematic review and European Treatment Guideline. *Eur Child Adolesc Psychiatry*, 2006; 15: 476-955, Medikinet SmPC, www.fass.se

◆ Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Medikinet® (metylfenidat) är ett receptbelagt läkemedel inom läkemedelsförmånen. Tabletter 5 mg, 10 mg och 20 mg samt kapslar med modifierad frisättning 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg och 60 mg. Indikationer: Medikinet® kapslar med modifierad frisättning är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år och äldre och hos vuxna, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandlingen ska initieras och övervakas av en läkare som är specialist på behandling av ADHD, såsom en barnläkarspecialist, en barn- eller ungdomspsykiatriker eller en psykiatriker. **Kontraindikationer:** Ska inte användas under behandling med icke-selektiva, irreversibla monoaminoxidas (MAO)-hämmare, vid ångest, symtom på svår depression, psykotiska symtom, psykopatologiska personlighetsförändringar, spänndhet eller oro, tics, tourettes syndrom, kardiovaskulär sjukdom, glaukom, feokromocytom hypertyreoidism, tyreotoxikos, överkänslighet mot metylenidat mm. **Biverkningar:** Nervositet, sömnlöshet, aptitlöshet. Senaste översyn av SmPC jan 2018. För ytterligare information se produkt-resumé eller www.fass.se Evolan Pharma AB, tel 08-544 960 30.



EVOLAN.

Medikinet kapsel

- Behandling kan inledas med 5 mg eller 10 mg kapsel. Dosen ökas successivt.
- Kapseln är delbar och innehållet kan strös på mjuk mat.
- Rekommenderad daglig maxdos är 60 mg för barn och 80 mg för vuxna.
- Snabbt insättande effekt med 50% av dosen och långverkande effekt med resterande 50%.
- Upp till 8 timmars effektduration.